

## Erläuterungen zur Tabelle im unteren Bereich!

Impfung Babys und Kleinkinder	Säugling 6 Wochen	Säugling 2 Monate	Säugling 3 Monate	Säugling 4 Monate	Säugling 5-10 Monate	Kleinkind 11* Monate	Kleinkind 12 Monate	Kleinkind 13-14 Monate	Kleinkind 15 Monate	Kleinkind 16-23 Monate
Tetanus <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Diphtherie <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Keuchusten (Pertussis) <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Kinderlähmung (Poliomyelitis) <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Hib <sup>b</sup> (Haemophilus influenzae B)		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)						
Meningokokken (Serogruppe C)							G1	N		
Masern						G1	N		G2	N
Mumps, Röteln						G1	N		G2	N
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N
Grippe (Influenza)										

HPV (Humanes Papillomvirus)									
Herpes Zoster									
<b>Impfung Kinder, Jugendliche Und Erwachsene</b>	Kinder 2-4 Jahre	Kinder 5-6 Jahre	Kinder 7-8 Jahre	Jugendliche 9-14 Jahre	Jugendliche 15-16 Jahre	Jugendliche 17 Jahre	Erwachsene ab 18 Jahre	Erwachsene ab 60 Jahre	
Tetanus <sup>b</sup>	N	A1	N	A2		N	A <sup>e</sup>		
Diphtherie <sup>b</sup>	N	A1	N	A2		N	A <sup>e</sup>		
Keuchusten (Pertussis) <sup>b</sup>	N	A1	N	A2		N	A3 <sup>e</sup>	N	
Kinderlähmung (Poliomyelitis) <sup>b</sup>	N			A1		N			
Hepatitis B <sup>b</sup>	N								
Hib <sup>b</sup> (Haemophilus influenzae B)	N								
Pneumokokken <sup>b</sup>								S <sup>g</sup>	
Rotaviren									
Meningokokken (Serogruppe C)	N								
Masern	N						S <sup>f</sup>		
Mumps, Röteln	N								
Windpocken (Varizellen)	N								
Herpes zoster (HZ)								G1 <sup>h</sup>	G <sup>h</sup>

HPV (Humanes Papillomvirus)				G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N		
Grippe (Influenza)								S (jährlich)

Erläuterungen zu den Tabellen:

G = Grundimmunisierung in bis zu 3 Teilimpfungen (G1-G3)

S = Standardimpfung

A = Auffrischungsimpfung

N = Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

<sup>a</sup> = Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

<sup>b</sup> = Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

<sup>c</sup> = Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate

<sup>d</sup> = Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich

<sup>e</sup> = Td-Auffrischungsimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

<sup>f</sup> = Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

<sup>g</sup> = Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff

<sup>h</sup> = Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

\* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden